



آلبنداویت پلاس آلبندازول + کبالت + سلنیموم سوسپانسیون خوراکی

گروه دارویی: ضد انگل

ترکیب: هر میلی لیتر حاوی ۲۵ میلی گرم آلبندازول ۰,۲۷ میلی گرم سلنیموم و ۰,۶۲۴ میلی گرم کبالت می باشد.

حیوان هدف: گاو، گوسفند و بز

موارد مصرف: این محصول یک ضد انگل وسیع الطیف برای کنترل آلودگی های ناشی از کرم های گرد بالغ و نابالغ در حال رشد معدی-روده ای، ریوی، کرم های نواری و کپلک بالغ کبیدی در گاو، گوسفند و بز می باشد. این محصول همچنین از بین برنده تخم کرم های گرد و کپلک نیز می باشد و بنابراین باعث کاهش آلودگی های ثانویه می شود.

طیف اثر:

کرم های گرد: استرناژیا، همونکوس، تریکواسترانژیلوس، نماتوویروس، ازوفاگوستوموم، بونوستوموم، کوپریا و گونه های استرانژیلوئیده
کرم های ریوی: دیکتیو کولوس فیلاریا
کرم های نواری: گونه های مونیزیا
کپلک های بالغ کبیدی: فاسیولا هپاتیکا

میزان و طریقه مصرف:

• گاو: برای کنترل کرم های گرد ریوی نواری و کپلک و تخم کرم های گرد: ۷,۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل ۱۵ میلی لیتر به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن بدن
فاسیولوز مزمن: ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل ۲۰ میلی لیتر به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن بدن
• گوسفند: برای کنترل کرم های گرد ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل ۲ میلی لیتر به ازای ۱۰ کیلوگرم وزن بدن

فاسیولوز مزمن: ۷,۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل ۱۵ میلی لیتر به ازای ۵ کیلوگرم وزن بدن
موارد منع مصرف: از مصرف همزمان مکمل های کبالت و سلنیم خودداری شود، مگر با تجویز دکتر دامپزشک

زمان پرهیز از مصرف: از مصرف گوشت گاو تا ۱۴ روز، گوسفند تا ۴ روز و شیر گاو تا ۶۰ ساعت پس از آخرین نوبت درمان خودداری شود، در گوسفندانی که شیر آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

نداخلات دارویی: گزارش نشده است.

موارد احتیاط:

• جهت مصرف خوراکی از شربت خوران استفاده شود.
• قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید و از تماس با دست جلوگیری گردد.
شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته بندی: ظرف ۱ لیتری