



سایکلوت - ال

داکسی سایکلین ۱۰٪
محلول خوراکی

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر میلی لیتر سایکلوت ال حاوی ۱۰۰ میلی گرم داکسی سایکلین (های کلیت) می باشد.
موارد مصرف:

داکسی سایکلین علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، مایکوپلاسماها، کلامیدیا، ریکتزیا، اسپیروکت ها و بعضی پروتوزوآها بکار می رود. این دارو در طیور جهت درمان بیماری های کلی باسیلوز، سینهویت عفونی، وبای مرغان (پاستورولوز)، ورم روده نکروتیک، کوریزای عفونی، عفونت کیسه های هوایی، سالمونلوزیس و عفونت های استافیلوکوکی تجویز می گردد.

مقدار و روش مصرف:

جهت درمان طیور گوشتی مقدار ۰/۵ تا ۱ لیتر از محلول داکسی سایکلین ۱۰٪ در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی طیور به مدت ۲ تا ۵ روز متوالی استفاده گردد.
توصیه ها: محلول تهیه شده باید در مدت ۱۲ ساعت مصرف شود.

تداخل دارویی:

- این دارو نباید همزمان با پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزیدها مصرف شود
- از مصرف این دارو با ترکیبات حاوی کلسیم، روی، آهن و ملین های حاوی منیزیم خودداری گردد.
- از مصرف توأم داکسی سایکلین با بی کرینات سدیم، کائولین پکتین، سالیسیلات و بیسموت می بایست خودداری کرد.

موارد منع مصرف: در مرغان تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد مصرف نشود.

زمان پرهیز از مصرف: در طیور گوشتی ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

احتیاط: دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: بطری یک لیتری