



سایکلوت

داکسی سایکلین ۵۰٪
پودر محلول در آب

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر گرم سایکلوت حاوی ۵۰۰ میلی گرم داکسی سایکلین (های کلیت) می باشد.

موارد مصرف:

داکسی سایکلین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، مایکوپلاسماها، کلامیدیا، ریکتزیا، اسپروکت ها و بعضی پروتوزوآها بکار می رود. در درمان CRD، کلی باسیلوز و اورنیتوز در بوقلمون در مقایسه با تتراسایکلین های دیگر اثر بیشتری دارد.

مقدار و روش مصرف:

در طیور گوشتی مقدار ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم سایکلوت در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی طیور به مدت ۴ تا ۷ روز متوالی استفاده گردد.

توصیه ها: محلول تهیه شده باید در مدت ۲۴ ساعت مصرف شود.

تداخل دارویی:

- این دارو نباید همزمان با پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزیدها مصرف شود.
- از مصرف این دارو با ترکیبات حاوی کلسیم، روی، آهن و ملین های حاوی منیزیم خودداری گردد.

موارد منع مصرف: در مرغان تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد مصرف نشود.

زمان پرهیز از مصرف: در طیور گوشتی ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

سته بندی: ساشه ۵۰۰ گرمی