



مادوراوت

مادورامایسین 1 %
گرانول مخلوط در دان

گروه دارویی: کوکسیدیواستات یونوفوره

ترکیب: هر کیلوگرم مادوراوت حاوی ۱۰ گرم مادورامایسین می باشد.

موارد مصرف:

مادورامایسین جهت کنترل، پیشگیری و درمان کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی، پالت و بوقلمون که ناشی از گونه های مختلف آیمریا مثل تنلا، نکاتریکس، ماکسیما، آسرولینا و میواتی استفاده می شود، و همچنین باعث افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل می گردد.

مقدار و روش مصرف: ۵۰۰ گرم در یک تن خوراک جوجه گوشتی مصرف شود.

تداخل دارویی:

• همزمان با دیگر کوکسیدیواستاتهای یونوفوره مصرف نشود.

• از مصرف این دارو ۷ روز قبل، ۷ روز بعد و در حین مصرف تیامولین پرهیز شود.

موارد منع مصرف: در مرغان تخمگذار و مرغ مادر و دیگر گونه های پرندگان مصرف نشود.

زمان پرهیز از مصرف: مصرف دارو ۵ روز پیش از کشتار متوقف شود.

موارد احتیاط:

• دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

• در هنگام حمل و نقل و مخلوط نمودن از دستکش، لباس مخصوص و ماسک ضد غبار استفاده نمایید.

• در صورت تماس محصول با چشم سریعاً با آب شستشو داده شود.

توصیه: برای یکنواختی بیشتر مکمل در خوراک لازم است ابتدا اختلاط با حجمهای کوچکتر خوراک صورت گیرد و سپس با خوراک نهایی مخلوط شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت ۵ کیلوگرمی