



## موننسیوت

موننسن سدیم 10 %  
گرانول مخلوط در دان

### گروه دارویی: کوکسیدیواستات یونوفوره

**ترکیب:** هر کیلوگرم پرمیکس موننسیوت محتوی ۱۰۰ گرم موننسن فعال می باشد.

**موارد مصرف:** جهت کنترل و پیشگیری کوکسیدیوز ناشی از کلیه گونه های بیماری زای آیمریا در جوجه های گوشتی، پولتھا و بوقلمون های گوشتی.

### مقدار و روش مصرف:

۱۰۰۰ - ۱۲۰۰ گرم موننسیوت در هر تن دان در تمام طول دوره پرورش

• جوجه گوشتی: از یک روزگی تا سه روز قبل از کشتار

• پولت های تخمگذار: از یک روزگی تا ۱۶ هفتگی

• بوقلمون های گوشتی: ۱۰۰۰ - ۹۰۰ گرم موننسیوت در هر تن دان از یک روزگی تا ۱۶ هفتگی

### موارد منع مصرف:

• در اسب و سایر تک سمی ها مصرف نشود. موننسن برای تک سمی ها کشنده است.

• از مصرف همزمان با تیامولین به علت کاهش رشد خودداری نمایید.

• در طیور در حال تخمگذاری مصرف نشود.

• استفاده همزمان موننسن با اریتروماپسین و یا سولفانامیدها به علت احتمال بروز مسمومیت توصیه نمی گردد.

**توصیه:** ابتدا مقدار مورد نیاز پرمیکس را حداقل با ۵ تا ۱۰ برابر وزن آن از خوراک به خوبی مخلوط نموده و سپس مخلوط حاصل را در حجم خوراک مورد نظر اضافه نمایید و مجددا بطور کامل مخلوط نمایید.

### موارد احتیاط:

• در هنگام حمل و نقل و کاربرد دارو از ماسک، لباس محافظ و دستکش استفاده نمایید.

• در صورت ورود تصادفی دارو به داخل چشم، به سرعت محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.

• دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

**شرایط نگهداری:** در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

**بسته بندی:** پاکت ۵ کیلوگرمی