



تایلووت اس تایلووزین تارترات پودر محلول در آب

گروه دارویی: آنتی بیوتیک (گروه ماکرولیدها)

ترکیب: هر ساشه تایلووت اس حاوی ۱۱۰ گرم تایلووزین تارترات معادل ۱۰۰ گرم تایلووزین (BASE) می باشد.
موارد مصرف: تایلووت اس بر علیه طیف وسیعی از باکتری های گرم مثبت، باکتری های گرم منفی و برخی ویروس ها موثر است. از این آنتی بیوتیک جهت پیشگیری و درمان CRD در طیور استفاده می شود.

مقدار و روش مصرف:

- جهت پیشگیری و درمان در جوجه گوشتی و پولت: جهت پیشگیری یک ساشه تایلووت در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت سه روز (صفر تا ۳ روزگی)، سپس در سن ۳ تا ۴ هفتگی به مدت ۲۴ ساعت و جهت درمان همین دوز به مدت ۳ تا ۵ روز استفاده شود.
- جهت پیشگیری و درمان در بوقلمون: جهت پیشگیری یک ساشه تایلووت در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ روز (صفر تا ۵ روزگی)، سپس در سن ۴ هفتگی به مدت ۴۸ ساعت و جهت درمان همین دوز به مدت ۳ تا ۵ روز استفاده شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در جوجه های گوشتی یک روز و در بوقلمون ها ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو متوقف شود. در پولت ها ۲ روز پس از قطع مصرف دارو، تخم مرغ ها عاری از آنتی بیوتیک می باشند.

موارد احتیاط:

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- محلول حاوی دارو حداکثر تا سه روز مورد استفاده قرار گیرد.
- توصیه:** برای حلالیت بیشتر، ابتدا محتوی یک ساشه را در ۴ لیتر آب ولرم حل کرده و سپس محلول را به دوز مورد نظر برسانید.
- شرایط نگهداری:** در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.
- بسته بندی:** ساشه ۱۱۰ گرمی