



## وتاکوکس 120 سالینومایسین 12 % پودر مخلوط در دان

### گروه دارویی: کوکسیدیاوستات یونوفوره

**ترکیب:** هر کیلوگرم وتاکوکس ۱۲۰ حاوی ۱۲۰ گرم سالینومایسین سدیم می باشد.  
**موارد مصرف:** این دارو جهت پیشگیری، کنترل و درمان کوکسیدیوز طیور گوشتی ناشی از گونه های مختلف آمریا مثل نکاتریس، میواتی، ماکسیم، آسروولینا، تنلا و برونٹی بکار می رود.

### مقدار و روش مصرف:

- جوجه گوشتی: ۵۰۰ گرم وتاکوکس ۱۲۰ در هر تن خوراک از یک روزگی تا ۵ روز قبل از کشتار
- پولت تخمگذار: ۳۵۰ تا ۵۰۰ گرم وتاکوکس ۱۲۰ در هر تن خوراک از یک روزگی تا ۷ روز قبل از شروع تخمگذاری

### تداخل دارویی:

- از استفاده همزمان این دارو با سایر کوکسیدیاوستات های یونوفوره باید خودداری کرد.
- از مصرف این دارو ۷ روز قبل، ۷ روز بعد و در حین مصرف تیامولین می بایست پرهیز گردد.
- زمان پرهیز از مصرف:** ۵ روز قبل از کشتار جوجه های گوشتی و ۷ روز قبل از شروع تخمگذاری پولت ها از مصرف دارو خودداری گردد.

### توجه:

- مصرف این محصول می تواند برای اسب و بوقلمون های بالغ کشنده باشد.
- در مرغان تخمگذاری که تخم مرغ آنها مصرف انسانی دارند استفاده نشود.

### احتیاط:

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- هنگام مخلوط کردن وتاکوکس ۱۲۰ با خوراک از لباس محافظ و ماسک استفاده گردد.
- در صورت تماس دارو با چشم، سریعاً چشم با مقدار زیادی آب شستشو داده شود.
- توصیه:** برای یکنواختی بیشتر توزیع وتاکوکس ۱۲۰ در دان طیور ابتدا اختلاط با مقدار کمی دان، مکمل معدنی و یا سایر اجزاء دان صورت گرفته سپس به دقت و به طور کامل با دان نهایی مخلوط شود.
- شرایط نگهداری:** در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

**بسته بندی:** پاکت ۵ کیلو گرمی