



وتوکسی ۲۰۰

اکسی تتراسایکلین ۲۰٪ پودر محلول در آب

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر ۱۰۰ گرم وتوکسی ۲۰۰ حاوی ۲۰ گرم اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید می باشد.

موارد مصرف:

جهت درمان عفونت های باکتریایی اولیه و ثانویه حساس به اکسی تتراسایکلین، مانند CRD، سینوزیت عفونی، پاستورلوز، هپاتیت عفونی، تاج آبی، اسپیروکتوز و اسهال سفید در طیور، عفونت های قسمت فوقانی دستگاه تنفس، عفونت های دستگاه گوارش، کوریزا و عفونت های حاصله بعد از استرس در طیور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در درمان عفونت های روده ای ناشی از سالمونلا و اشریشیاکلی در گوساله ها و بره ها استفاده می شود.

مقدار و روش مصرف:

• طیور:

درمان: ۶۰ تا ۱۲۵ گرم پودر وتوکسی ۲۰۰ در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی.

• نشخوار کنندگان:

۱۰ تا ۵۵ میلی گرم اکسی تتراسایکلین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در آب آشامیدنی حل شود.

توصیه: محلول تهیه شده باید در مدت ۲۴ ساعت مصرف شود.

داخل دارویی:

این دارو نباید همراه پنی سیلین ها، استرپتومایسین، باسیتراسین، انروفلوکساسین، پلی میکسین و بی کربنات سدیم و همچنین ترکیبات حاوی کاتیون های فلزی آهن، منیزیم و کلسیم مصرف شود.

زمان پرهیز از مصرف:

• مصرف دارو ۵ تا ۷ روز قبل از کشتار قطع شود.

• تخم مرغ طیور تحت درمان ۷ تا ۱۰ روز پس از قطع دارو قابل مصرف می باشد.

شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم

خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه ۱۰۰ گرمی