



لینکوت

لینکومایسین ۴۰٪
پودر محلول در آب

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر گرم لینکوت ۴۰ حاوی ۴۰۰ میلی گرم لینکومایسین خالص می باشد.

حیوان هدف: طیور گوشتی و زنبور عسل

موارد مصرف:

به منظور درمان بیماری آنتریت نکروتیک (ورم روده نکروتیک) ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس در طیور گوشتی و همچنین جهت کنترل بیماری لوک آمریکایی (لارو پانی باسیلوس) در زنبور عسل مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان و طریقه مصرف:

طیور گوشتی: جهت درمان آنتریت نکروتیک ۷۵ گرم در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی (معادل ۳۰ میلی گرم لینکومایسین در یک لیتر آب) به مدت حداکثر ۷ روز تجویز می گردد.

زنبور عسل: به ازای هر کند و ۱۰۰ میلی گرم از لینکومایسین را با ۲۰ گرم پودر شکر مخلوط نموده (هر گرم از محصول را با ۸۰ گرم پودر شکر مخلوط نموده و برای ۴ کندو استفاده نمایید و بر روی قابلهایی که در آنها تخم ریزی شده است بپاشید). این عمل را به صورت یک بار در هفته و به مدت ۲ هفته انجام دهید.

موارد منع مصرف:

مصرف در طیور مادر، تخمگذار و بوقلمون منع شده است.

تداخلات دارویی: تجویز همزمان لینکومایسین با ماکرولیدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارویی می گردد.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت یک ماه مصرف شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه ۷۵ گرمی