

ونامپروول ۹/۶

آمپروولیوم ۹/۶٪
محلول خوراکی

گروه دارویی: ضدکوکسیدیوز

شکل دارویی: محلول خوراکی

ترکیب: هر میلی لیتر از محصول حاوی ۹۶ میلی گرم آمپروولیوم فعال می باشد.

حیوان هدف: طیور گوشتی، پولت های مادر و تخمگذار، مرغان مادر و بوقلمون

موارد مصرف: جهت پیشگیری و درمان بیماری کوکسیدیوز طیور مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان و طریقه مصرف:

۲۵۰ میلی لیتر را در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به خوبی حل کرده و به عنوان تنها منبع آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز در اختیار گله قرار دهید. در همه گیریهای شدید ۵۰۰ میلی لیتر از محلول را در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی حل کرده، ابتدا به مدت ۳ تا ۵ روز و سپس درمان را با مقدار ۱۲۵ میلی لیتر در ۲۰۰ لیتر آب به مدت یک تا دو هفته ادامه دهید.

موارد منع مصرف: در طیور تخمگذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

تداخلات دارویی: از مصرف همزمان با سایر ضدکوکسیدیوز های درمانی و فورازولیدون خودداری شود.

موارد احتیاط:

- پس از باز شدن درب بطری، محتویات در مدت ۲ ماه باید مصرف شود.
 - محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا ۲۴ ساعت باید مصرف شود.
 - با جیره هایی که حاوی مقادیر بالای کولین کلراید یا تیامین می باشند، مصرف نشود.
- شرایط نگهداری:** در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
- بسته بندی:** بطری ۱ لیتری